

## LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE IN PROVINCIA DI PARMA ANNO 2018

Adempimenti previsti dalla determinazione n. 7488 del 21 maggio 2018 del Responsabile del Servizio Fitosanitario "Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2018". Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 maggio 2000 sono dichiarate "zone di insediamento" le aree vitate dell'intero territorio della provincia di Parma.

### ADEMPIMENTI PREVISTI NEL 2018

Nelle "zone di insediamento" obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata o di asportare obbligatoriamente da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di Flavescenza dorata.

Obbligo di estirpare le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di Flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale.

Obbligo di estirpare obbligatoriamente al di fuori delle "zone di insediamento" ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da Flavescenza dorata.

Obbligo di eseguire in tutte le aree vitate della provincia di Parma **n. 1 trattamento** contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (vedi [www.fitosanitario.pr.it](http://www.fitosanitario.pr.it) e [www.stuard.it](http://www.stuard.it))

Obbligo di eseguire nei vigneti a conduzione biologica, ubicati in tutte le aree vitate della provincia di Parma, **almeno n. 2 trattamenti** contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario regionale e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (vedi [www.fitosanitario.pr.it](http://www.fitosanitario.pr.it) e [www.stuard.it](http://www.stuard.it)).

Obbligo di eseguire nei campi di piante madri per marze e per portinnesti **n. 2 trattamenti** e nei barbatellai **n. 3 trattamenti** contro il vettore *Scaphoideus titanus*.

## TRATTAMENTI OBBLIGATORI CONTRO SCAFOIDEO

Per salvaguardare le api i trattamenti contro *Scaphoideus titanus* vanno eseguiti dopo la completa sfioritura della vite e dopo aver sfalciato da almeno 48-72 ore le erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura come previsto dall'art. 15 della L.R. 25 agosto 1988 n. 35 e dal DPGR 4 marzo 1991 n. 130.

Il primo trattamento dovrà essere realizzato a partire dal 14 giugno 2018, e comunque non prima della completa sfioritura della vite, ed entro e non oltre il 10 luglio 2018. Nei vigneti in cui vi è l'obbligo di eseguire 2 trattamenti, questi dovranno comunque essere effettuati nel periodo compreso fra il 14 giugno ed il 5 agosto 2018.

I bollettini tecnici provinciali indicano le epoche consigliate per eseguire gli interventi sulla base del monitoraggio eseguito dal Consorzio Fitosanitario Provinciale.

Di seguito si riportano gli insetticidi ammessi in difesa integrata volontaria ai sensi degli specifici provvedimenti normativi (Reg. CE 1698/2005, Reg. CE 1308/2013, Reg. UE 1305/2013, L.R. 28/98 e L.R. 28/99) ed in agricoltura biologica (Reg. CE 834/2007, CE 889/2008, UE n. 354/2014 e UE n. 673/2016).

Le aziende viticole che non rientrano in tali campi applicativi possono utilizzare anche altri insetticidi purché autorizzati per la lotta alle cicaline della vite.

### PRODUZIONE INTEGRATA: N. 1 TRATTAMENTO OBBLIGATORIO

Sostanza attiva	Formulato Commerciale	Dose g o ml/hl	Epoca intervento
❶ Thiametoxam	Actara 240 SC (Syngenta)	20 (0,2 l/ha)	Tra  20 Giugno e 5 Luglio
	Actara 25 WG, Capcadis (Syngenta)	20 (0,2 kg/ha)	
❶ Acetamiprid	Epik SL (Sipcam)	150 (1,5 l/ha)	
	Kestrel (Adama)	25 - 45 (0,25-0,35 l/ha)	
❷ Clorpirifos metile	Reldan 22, Clormetil (Dow), Devox (Scam), Metidane 22, Vitador (Diachem), Runner LO, Reldan LO (Sipcam), Pyrinex M 22 (Adama), Cutis (Linha), Terial 22 (BASF), Cleaner 22 (Scam), Kukar 22 (Gowan), Etifos ME (Du Pont), ecc.	150	
❷ Etofenprox	Trebon UP (Sipcam)	50 (0,5 l/ha)	

**Con elevata presenza di Scafoideo è consigliata l'esecuzione di 2 trattamenti specifici: il 1° nel periodo 14-30 giugno ed il secondo dopo circa 30 giorni.**

❶ Al massimo un intervento all'anno tra Thiametoxam e Acetamiprid.

❷ Clorpirifos metile ed Etofenprox possono essere utilizzati una sola volta nel corso della stagione.

Si ricorda che nelle aziende che aderiscono all'Az. 1 DIA di cui alla Misura 214 del Reg. CE 1698/05 gli esteri fosforici non sono ammessi.

### AGRICOLTURA BIOLOGICA: N. 2 TRATTAMENTI OBBLIGATORI

**Nelle zone con elevata presenza di Scafoideo è fortemente raccomandata l'esecuzione di un 3° intervento.**

Sostanza attiva	Formulato Commerciale	Dose g o ml/hl	Epoca intervento
Piretrine pure (*)	Asset Five (Copyr), Estel (Sipcam), Abanto (Industrias Afrasa), Piretro Natura (Cerrus, Manica), Afitin L (Sipcam, Natur Breaker (Certis Europe))	64 (0,96 l/ha) 75 - 90 (0,75 l/ha)	1° dal 14 al 25 giugno  2° dopo circa 10 giorni
	Biopiren Plus (CBC Europe), Agro-pyr, Piretro verde, Flora verde (Copyr), Piretro ActiGreen (Bayer), Several (Serbios), ecc.	140 - 160	

(\*) Intervenire nelle ore serali, bagnare bene la vegetazione, acidificare l'acqua se il pH è > 7.

Le aziende agricole ubicate nelle aree nelle quali è previsto un trattamento obbligatorio che intendono utilizzare i prodotti ammessi in agricoltura biologica dovranno eseguire i due trattamenti previsti per i vigneti a conduzione biologica.